

**POPPERS**

*info*

I'MAGINA\_

# ¿QUÉ ES POPPERS?

Son nitritos de amilo, butilo o isobutilo.

**Presentación:** líquido volátil en botes de vidrio; a veces gel sólido.

**Vía:** inhalación de vapores (líquido) o aplicación externa (gel).

**Duración:** 1-3 min.

# EFECTOS DESEADOS

Euforia.

“Subidón” breve.

Relajación de la musculatura lisa del cuerpo, como el esfínter anal (facilita la penetración), pero también la musculatura del corazón (\*ver advertencias)

# EFECTOS ADVERSOS

Mareo, cefalea.

Taquicardia.

Malestar.

Dificultad eréctil.

Dependencia psicológica (sexo asociado a popper).

## **Efectos graves:**

Cianosis (labios/uñas azuladas).

Vómitos.

Desmayos.

Alteración de presión ocular.

Paranoia.

# ADVERTENCIAS

Nunca ingerir: corrosivo y potencialmente mortal.

Muy inflamable: alejar de llamas/cigarrillos/velas.

Mantener botes cerrados; limpiar el borde en cada uso.

Evitar contacto directo con piel/fosas nasales (quemaduras).

# ADVERTENCIAS

Evitar mezclar  
con estimulantes  
(sobreesfuerzo  
cardiaco), depresores (bajadas  
de tensión) y \*fármacos para  
disfunción eréctil (hipotensión  
severa)

# REDUCCIÓN DE DAÑOS

Espacia tomas; no inhalar más de 2 veces por toma (1 por fosa) y esperar  $\geq 5$  min.

Limpia y cierra el bote tras cada uso; evita derrames y contacto con piel.

Si aparecen efectos adversos, detén el consumo.