

VIAGRA

**Y OTROS TRATAMIENTOS PARA LA
DISFUNCIÓN ERÉCTIL**

IMAGINA_

¿QUÉ SON?

Son fármacos vasodilatadores que actúan sobre la *musculatura lisa*, que estimulan el flujo sanguíneo hacia el pene, facilitando la erección.

Vías de administración:

Oral (comprimidos): Viagra, Cialis, Levitra y genéricos.
Generalmente son de color azul.
Tópica (crema).
Inyectable.

EFECTOS DESEADOS

En muchos casos, quienes consumen estas medicaciones en los chills buscan contrarrestar los efectos de las sustancias y lograr una erección.

El problema es que se suelen adquirirse sin receta (dealers, internet), lo que aumenta los riesgos por falta de control médico.

EFECTOS ADVERSOS

Enrojecimiento de la piel.

Cefalea, mareos.

Congestión nasal.

Alteraciones visuales (vista borrosa, mayor sensibilidad a la luz).

Malestar estomacal.

Pérdida de audición.

Isquemia coronaria.

EFECTOS GRAVES

Una **erección** que **dure más de 4 horas** (priapismo) requiere **acudir** de inmediato a **urgencias** para evitar lesiones permanentes en el pene.

El uso reiterado de estos fármacos puede generar dificultades en la erección cuando el fármaco no está presente.

ADVERTENCIAS

En España, estos fármacos requieren prescripción médica tras una valoración clínica. No se recomiendan en personas con:

Hipotensión o hipertensión no controlada.

Enfermedades oculares que afectan a la retina.

Problemas cardíacos, hepáticos o renales.

RIESGOS DE COMBINARLOS CON DROGAS

Con **alcohol**: Disminución de la presión arterial, lo que aumenta el riesgo de problemas cardíacos y pérdida de conocimiento.

Con **estimulantes** (mefedrona, metanfetamina, cocaína, etc.): aumenta el riesgo de fallo cardíaco y complicaciones graves.

RIESGOS DE COMBINARLOS CON DROGAS

Con **popper**:

Ambos son vasodilatadores que actúan sobre la musculatura lisa (presente en el corazón), por lo que se incrementan los efectos no deseados.

Como riesgo de descenso brusco de la presión arterial, taquicardia, mareos o pérdida de conocimiento e infarto.

REDUCCIÓN DE DAÑOS

No combines estos medicamentos con popper ni con drogas estimulantes.

Usa dosis prescritas por un profesional.

Evita comprarlos sin receta: podrían ser falsificados o de composición desconocida.

Si los consumes en un chill, hidrátate, descansa y presta atención a señales de alarma.